

## LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ



- Laboratuvara sadece görevli kişilerin girmesini sağlayın.
- Kapının üzerinde biyolojik tehlike ve laboratuvardaki potansiyel tehlikeleri belirten güvenlik işaretleri bulundurun.
- Laboratuvar da kişisel koruyucu donanımları (eldiven, önlük ve maske) kullanın.
- Ellerinizi laboratuvara girişte ve çıkışta (eldiven kullanılmış olsa bile) yıkayın.
- Laboratuvar teknik alanlarının ve çalışma masalarının her çalışma sonunda uygun dezenfektan ile temizlenmesini sağlayın.
- Atıkları uygun şekilde dekontamine ederek tıbbi atık kaplarına atın.
- Kültür ve ilaç duyarlılık testi çalışılan tüberküloz laboratuvarlarında aerosol oluşturan işlemleri Sınıf II biyogüvenlik kabini içerisinde yapın.



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Halk Sağlığı  
Genel Müdürlüğü

2 - 3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olan ve akciğer bulguları antibiyotik tedavisi ile düzelmeyen hastalarda tüberküloz araştırılmalıdır.



Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü  
Sağlık Mah. Adnan Saygun 2 Caddesi  
No: 55 • 06100 • Sıhhiye / Ankara  
0 (312) 565 50 00  
<http://www.hsgm.gov.tr>



T.C. Sağlık Bakanlığı  
Halk Sağlığı  
Genel Müdürlüğü


# HEDEFİMİZ VEREMSİZ BİR TÜRKİYE !

**SAĞLIĞINIZI KORUMAK İÇİN ENFEKSİYON KONTROL  
ÖNLEMLERİNİ ALMAYI UNUTMAYINIZ !**





## HASTA TRİAJI




- Öksüren hastaların maske takmasını sağlayınız.
- Öksüren hastalara muayenede öncelik veriniz.
- Akciğer grafisi vb. tanısal tetkiklerin sıra bekletilmeden yapılmasını sağlayınız.



Ellerinizi sık sık yıkayınız.

## FİLTRELİ MASKELER



- Sağlığınızı korumak için şüpheli ya da kesin tanıla bulaştırıcı tüberküloz hastası ile temas ederken filtreli maskenizi takmayı unutmayınız!
- Yüzünüze uygun olmayan maskeyi kullanmayınız.

**Filtreli Maskenizi (FFP3 veya N95) aşağıdaki durumlarda mutlaka kullanınız;**

- Yayma pozitif tüberküloz hastasıyla temas ederken,
- Tüberküloz hastasında öksürüğe neden olan işlemler (bronkoskopi, balgam indüksiyonu vb.) sırasında,
- Şüpheli ya da kesin tanıla bulaştırıcı tüberküloz hastasının nakli sırasında,
- Şüpheli ya da kesin tanıla bulaştırıcı tüberküloz hastasına acil cerrahi girişim ya da dış tedavisi sırasında.

## ÇEVRESEL KONTROL ÖNLEMLERİ



- Hastane ya da sağlık kuruluşlarında, hava akımı sağlık çalışanlarından ve tüberküloz olmayan kişilerden, tüberküloz hastalarının bulunduğu yöne doğru yönlendirilmelidir.
- Hastaların kullandığı poliklinik, bekleme salonları vb. odaların pencereleri açık tutulmalıdır. Saatte 6- 10 kez hava değişimi sağlanmalıdır.
- Yataklı servislerde hasta odalarının kapıları kapalı tutulmalı, pencereleri ya da balkon kapıları sık sık açılarak havalandırılmalıdır.
- Pencerelerin açılmadığı durumlarda, pencereye aspiratörler takılmalıdır.
- Hasta odasının tümü mekanik olarak güçlendirilmiş bir aspiratör ile baca ve dış ortama bağlanmalıdır.
- Sağlık kuruluşlarında poliklinikler, hasta odaları, laboratuvarlar ve gerekli diğer bölümlerde havalandırma ile birlikte ultraviyole lambaları kullanılmalıdır.
- Üst oda (korunmalı) UV cihazları 24 saat açık bırakılmalıdır.